

ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

VREME ZAŠTITE	RAZLOG TRETIRANJA	IZBOR PREPARATA
Po pojavi odraslih	Repina pipa	Lebaycid EC 50 1,5-2 l/ha
Posle nicanja (po potrebi)	Buvač	Lebaycid EC 50 1,5 l/ha
L1-L3 stupnja razvoja larve	Sovice (<i>M. brassicae</i>)	Fastac 10 EC 0,15-0,1 l/ha Wuxal Boron 1 L/ha
U svim kombinacijama	Sirokolisni korovi	1. (Metabeet 70 WG +
prvi tretman se obavlja		Betanal AM 11 1,5 L/ha) x 2
kada su korovi od kotile-		ili 2. (Metabeet 70 WG 2 kg/ha +
dana do 4 lista, a drugi		Betanal AM 11 1,5 l/ha) prvo tre-
7-10 dana kasnije		tiranje
		(Metabeet 70 WG 2 kg/ha +
		Betanal Progres 1,5 l/ha) drugo
		tretiranje ili
		3. (Metabeet 70 WG 1 kg/ha
		+ Satari 50 WG 0,02 kg/ha +
		Betanal Progres 1,5 l/ha +
		Trend 0,05%) x 2
Kada travni korovi dostignu	Uskolisni (travni) jednogodišnji	Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha
fazu razvoja 3-5 listova	dišnji i višegodišnji korovi	
	Cercospora beticola	Wuxal Boron 1-2 L/ha Zato WP 50 150 g/ha Silwet L-77 25 ml/100 L vode